

《蜂アレルギー検査のご案内》

* 蜂アレルギーとは？

蜂に刺された後、かゆみや発赤のような皮膚炎、
または嘔吐や寒気などの症状を起こすことがあります。
蜂毒の中にはアレルギー反応を起こす成分（アレルゲン）や
ヒスタミンが含まれているため、場合によっては
重症のアナフィラキシーに至る危険性があります。

厚生労働省の調査によると、蜂刺されのアナフィラキシーショックによる死亡例も
報告されており、その多くは40歳以上の男性でした。

血液検査



* 注意すべき蜂の種類

人を刺す習性があるのは、スズメバチ・アシナガバチ・ミツバチの3種類です。

* このような方は注意！

- ・ 農林業関係者・電気設備業者・ゴルフ場関係者
- ・ 養蜂業 ・ 山間部によく出かける方



スズメバチ



アシナガバチ

* 異常値がでたら？

血液検査で蜂毒のIgE抗体というタンパク質に異常値がでた場合は皮膚科に受診
してアナフィラキシーショックの応急処置法である携帯用の自己注射が処方され、
注射方法が指導されます。

当院皮膚科外来（毎週火曜）でも処方可能です。窓口までお問い合わせください。

<参考> エピペン注射液 13,752 円（税込） 事前予約が必要です

対象：スズメバチ・アシナガバチ・ミツバチ

料金：2,970 円（税込み）